



Suvaxyn® PCV2

Reg. SAGARPA B-0176-155



Vacuna a base de virus inactivado quimérico del Circovirus Porcino Tipo 1 y Tipo 2.

Fórmula

Suspensión inactivada de Circovirus quimérico porcino – cPCV 1-2 (Menor o igual a 5 dosis equivalentes por ml)
Potencia Relativa mayor o igual a 1.

Uso en

Cerdos sanos de 4 semanas de edad o mayores.

Indicaciones

Como ayuda en la prevención de la viremia causada por el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) y como ayuda en el control de la depleción linfóide causada por el PCV2.

Duración de la inmunidad

Los estudios de duración de la inmunidad indican que ésta es de cuatro meses (128 días) después de la vacunación.

Dosis y vía de administración

Inyectar asépticamente 2 mL por vía intramuscular.

Advertencias

Almacenar en la oscuridad entre 2 y 7° C.

No congelar.

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

Permitir que el producto alcance la temperatura ambiente y agitar bien antes de su aplicación.

Usar todo el contenido una vez abierto. Incinerar el envase y todo el contenido que no se haya utilizado. Posterior a la aplicación, pueden presentarse reacciones alérgicas.

El antídoto es la epinefrina.

Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.


Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentación

50 y 250 dosis.

Distribuido en México por:

Fort Dodge Animal Health, S. de R.L. de C.V.
Sevilla No. 821 Colonia Portales 03300
México, D.F.
Tel: 91.83.02.00.
fortdodge.com.mx



PROTECCIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD